

KVĚTNATÁ LOUKA NA DNĚ BÝVALÉHO RYBNÍKA VE STROMOVCE

Druhově pestré porosty – květnaté louky - jsou důležitým vegetačním prvkem, který kromě svého stabilizačního, ekologického a estetického významu nabízí útočiště drobnému hmyzu, opylovačům a motýlům. Protože kvetoucí byliny, které v louce nejvíce očekáváme, velmi pomalu klíčí a vzhází, je i doba vývoje porostu delší než u běžných trávníků, a trvá nejméně 2-3 roky v závislosti na termínu výsevu a klimatických podmínkách jednotlivých let. Pomalé zapojení porostu květnaté louky souvisí také s nízkými výsevky, které se u květnatých luk používají. V první fázi vývoje porostu se objeví především jednoleté plevely, které mohou do určité míry v suchých obdobích plnit funkci tzv. „krycí plodiny“ a tím omezovat výpar při vzházení žádoucích druhů rostlin. Květnatá louka se poprvé seče při výšce porostu cca 20-30 cm tzv. „na vysoko“ a tato seč se nazývá odplevelovací.

Někdy je nutné ji zopakovat. Poté už se louka seče v běžném režimu 2x-3x ročně a to na začátku června a v září, ale bezpodmínečně je nutné louky při seči nemulčovat, ale sušit na seno, popř. ze stanoviště odklidit pokosenou zelenou hmotu. V prvním roce od založení květnaté louky v porostu dominují kromě plevelů také trávy, ale postupně se začínají objevovat kopretiny, hvozdíky, kohoutky, šalvěje, barevné jeteloviny a další rostlinné druhy. Květnaté louky se nehnojí ani jinak chemicky neošetřují, takže jejich zakládání pozitivně přispívá ke zvýšení kvality našeho životního prostředí.

Květnatá louka na dně bývalého rybníka je nově oseta směsí bylin a travin „Stromovka“, která byla vytvořena Ing. Marií Strakovou, Ph.D., přímo na míru pro lokalitu na dně bývalého rybníka ve Stromovce.



V roce založení větší zastoupení plevelů na ploše



Květnatá louka - 3. rok po založení



Kosení luk ve Stromovce - červen 2017



Foto Jan Hromádko